

Nowoczesne odrobaczenie koni



Jak skutecznie zwalczać pasożyty,
w tym tasiemce?

U koni najbardziej istotne są 3 grupy pasożytów



Tasiemce



Nicienie



Gzy

3 grupy pasożytów u koni

T TASIEMCZYCE

Według najnowszych badań w Polsce **zarażonych może być około 30% koni!** Tasiemce występują **w 60% stad!** Inwazje tasiemców mogą wywołać ciężkie objawy napadowe kolki, zaburzenia trawienia, spadek kondycji. Mogą być także przyczyną wgłobień i perforacji jelit. Często inwazje przebiegają pozornie bezobjawowo, ale tasiemce wraz z innymi pasożytami mogą być odpowiedzialne za spadek odporności oraz zaburzenia w rozrodzie.

G GZAWICE

Inwazje gźów w Polsce występują **u około 15% koni.** Larwy obecne w żołądku i dwunastnicy powodują kolki oraz zaburzenia trawienia prowadzące do wyniszczenia zwierzęcia. W zarażeniach o małej intensywności nie występują zauważalne objawy kliniczne, natomiast mają one wpływ na poziom łaknienia.

N INWAZJE NICIENI

Najczęściej stwierdzanymi nicieniami u koni w Polsce są glisty, małe i duże słupkowce, owsiki oraz węgorki. Inwazje, często mieszane, dotyczą praktycznie **100% populacji koni.** Objawy zależne od rodzaju pasożytów oraz nasilenia inwazji to: wychudzenie, spadek kondycji, biegunki, kolki, zlokalizowany lub uogólniony świąd. Często dotyczą również narządów wewnętrznych takich jak płuca, wątroba, trzustka.

Kalendarz leczenia

Optymalny, kwartalny system odrobaczania

	wiosna	lato	jesień	zima
żrebięta	N	N	N + T + G	N
roczniaki	N + T	N + T	N + T + G	N
konie dorosłe	N + T	N + T	N + T + G	N
klacze	N + T	N + T	N + T + G	N
	N <i>odrobaczanie klaczy dodatkowo na 2 tygodnie przed datą porodu</i>			

G Gzy

N Nicienie

T Tasiemce



Skutecznie zwalczaj pasożyty, w tym tasiemce

- **Wybierz leki dostosowane do endemicznie występujących pasożytów**, kierując się wynikami wyrównawczych badań pasożytologicznych.
- **Stosuj preparaty zaufanych producentów**, których skuteczność oraz bezpieczeństwo działania potwierdzone jest stosownymi badaniami.
- **Dobierz odpowiednią dawkę leku** adekwatnie do masy ciała zwierzęcia.
- **Konsekwentnie przestrzegaj kalendarza odrobaczeń**. Synchronizuj odrobaczenie u wszystkich zwierząt w stajni.
- **Kał odrobaczanych zwierząt utylizuj** w okresie tygodnia po odrobaczeniu.
- **Zwierzęta nowo wprowadzone do stada profilaktycznie odrobacz** preparatami o szerokim spektrum działania.
- **Unikaj nadmiernego zagęszczenia koni** w stajni i na pastwisku.
- **Przestrzegaj zasad higieny w stajni** przez regularne usuwanie obornika oraz przeciwdziałanie zawilgoceniu stanowisk lub boksów.
- **Do nawożenia pastwisk stosuj tylko obornik kompostowany**. Usuń zalegający na pastwisku kał. Unikaj wypasów na terenach podmokłych.

Bibliografia

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk: Charakterystyka inwazji *Anoplocephala perfoliata* u koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych – monografia. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. – 109 s., ISSN 1899-2374

**NOWOCZESNY I BEZPIECZNY ŚRODEK PRZECIWPASOŻYTNICZY
W FORMIE DOUSTNEGO ŻELU**

MAX-ymalne odrobaczanie

MAX-ymalny skład:

iwermektyna i prazikwandel

MAX-ymalne spektrum:

tasiemce, nicienie, larwy gzów

MAX-ymalne bezpieczeństwo:

można stosować u dwutygodniowych źrebiąt, ciężarnych i karmiących klaczy, ogierów zarodowych, koni sportowych, rekreacyjnych i rzeźnych

MAX-ymalna dawka:

żel pozwala na odrobaczenie konia o masie ciała do 700 kg

MAX-ymalnie wygodny:

- **krótki czas podania leku**
dzięki innowacyjnemu, ergonomicznemu dozownikowi z szeroką dyszą ①
- **precyzyjne dawkowanie**
dzięki dokładnej skali po obu stronach tłoka ②
i systemowi blokującemu pokrętko ③

Dozownik doustny z żelem

ZNAJDZ WSZYSTKIE
RODZAJE TASIEMCÓW I
KONI

Preparat dostępny u lekarzy weterynarii

VIRBAC Sp. z o.o.
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. 22 855 40 42
fax 22 855 07 34

www.virbac.pl

Shaping the future of animal health

Virbac