


Nowoczesne odrobaczanie koni



Jak skutecznie zwalczać pasożyty, w tym tasiemce?

U koni występują 3 grupy pasożytów



G Inwazje **gzów** w Polsce dotyczą ponad 14,7% koni. Larwy obecne w żołądku i dwunastnicy powodują kolki oraz zaburzenia trawienia prowadzące do wyniszczenia zwierzęcia. W zarażeniach o małej intensywności nie występują zauważalne objawy kliniczne, natomiast mają one wpływ na poziom łaknienia.

T **Tasiemczyce** u koni w stadach – zarażenie w Polsce wynosi 29,9% populacji, tasiemce występują w 58,3% wszystkich stad. Podczas inwazji stwierdza się: zaburzenia trawienia, napadowe kolki, a nawet wgłębienia i perforacje jelit. Zauważalny jest spadek kondycji objawiający się najczęściej obniżeniem wydolności koni sportowych. Często inwazje przebiegają pozornie bezobjawowo, ale tasiemce wraz z innymi pasożytami są odpowiedzialne za spadek odporności oraz zaburzenia w rozrodzie.

N **Nicienie** u koni reprezentowane są najczęściej przez węgorki, glisty, małe i duże słupkowce oraz owsiki. Inwazje ze zróżnicowaną intensywnością, najczęściej mieszane, dotyczą praktycznie 100% populacji koni.

Objawy zależne od rodzaju pasożytów oraz nasilenia inwazji to: wychudzenie, biegunki, kolki, zlokalizowany lub uogólniony świąd. Często dotyczą również narządów wewnętrznych takich jak płuca, wątroba, trzustka wywołując podrażnienia.

Kalendarz leczenia. Optymalny, kwartalny system odrobaczania.

	wiosna	lato	jesień	zima
źrebięta	N	N	N + T + G	N
roczniaki	N + T	N + T	N + T + G	N
konie dorosłe	N + T	N + T	N + T + G	N
klacze	N + T	N + T	N + T + G	N
	odrobaczanie klaczy dodatkowo na 2 tygodnie przed datą porodu N			

N Nicienie

T Tasiemce

G Gzy



NOWOCZESNY I BEZPIECZNY
ŚRODEK PASOŻYTOBÓJCZY
W FORMIE DOUSTNEGO ŻELU

MAX-ymalne odrobaczanie

MAX-ymalny skład:

iwermektyna i prazikwantel

MAX-ymalne spektrum:

nicienie, tasiemce, larwy gzów

MAX-ymalne bezpieczeństwo:

można stosować u dwutygodniowych źrebiąt, ciężarnych i karmiących klaczy, ogierów zarodowych, koni sportowych, rekreacyjnych i rzeźnych

MAX-ymalna dawka:

żel pozwala na odrobaczenie konia o masie ciała do 700 kg

MAX-ymalnie wygodny:

- **krótki czas podania leku** dzięki innowacyjnemu, ergonomicznemu dozownikowi z szeroką dyszą 1
- **precyzyjne dawkowanie** dzięki dokładnej skali po obu stronach tłoka 2 i systemowi blokującemu pokrętko 3

Dozownik doustny z żelem

ZWALCZA WSZYSTKIE
RODZAJE TASIEMCÓW U KONI

Optymalizacja zwalczania pasożytów, w tym tasiemców

- **Wybierać leki dostosowane do endemicznie występujących pasożytów**, kierując się wynikami wrywkowych badań parazytologicznych.
- **Stosować preparaty zaufanych producentów**, których skuteczność oraz bezpieczeństwo działania potwierdzone jest stosownymi badaniami.
- **Dobrać odpowiednią dawkę leku** adekwatnie do masy ciała zwierzęcia.
- **Konsekwentnie przestrzegać kalendarza odrobaczeń**. Synchronizować odrobaczanie u wszystkich zwierząt w stajni.
- **Kał odrobaczanych zwierząt utylizować** w okresie tygodnia po odrobaczeniu.
- **Zwierzęta nowo wprowadzone do stada profilaktycznie odrobaczać** preparatami o szerokim spektrum działania.
- **Unikać nadmiernego zagęszczenia koni** w stajni i na pastwisku.
- **Przestrzegać higieny w stajni** przez regularne usuwanie obornika oraz unikać zawilgocenia stanowisk lub boksów.

Preparat dostępny u lekarzy weterynarii

VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 43, fax 22 855 07 34

www.virbac.pl

Shaping the future of animal health

Virbac