

Niepożądane zachowania u Twojego psa?

Obskakiwanie z odruchem kopulacyjnym



Dominacja wewnątrzgatunkowa



Ucieczki



Uciążliwe znakowanie terenu



60%

z tych zachowań jest bezpośrednio związanych z działaniem testosteronu



40%

z tych zachowań nie ma związku z działaniem testosteronu

Sprawdź jak jest u Twojego psa?


Poproś lekarza weterynarii o przeprowadzenie testu!

76% psów przejawia niepożądane zachowania wobec swoich opiekunów

■ Spośród szeregu zaburzeń behawioralnych, 4 poniższe mogą być związane z nadmiernym działaniem testosteronu:

- **Uciezki** w poszukiwaniu suki.
- **Obskakiwanie** nóg, zabawek, poduszek, innych zwierząt połączone z **odruchem kopulacyjnym**.
- **Dominacja** wobec innych psów.
- **Uciążliwe znakowanie** terenu.

■ W 60% przypadków znaczącą poprawę w zachowaniu psa przynosi zahamowanie wydzielania testosteronu, podczas gdy w 40% przypadków brak efektów.



Przeprowadź test z zastosowaniem implantu

Sprawdź, czy niewłaściwe zachowanie Twojego psa jest związane z działaniem testosteronu.

- Aplikacja podskórna implantu zawierającego octan desloreliny imituje stan odpowiadający kastracji chirurgicznej.
- Efekt wpływu implantu utrzymuje się przez okres co najmniej **6 miesięcy** i daje możliwość oceny wpływu redukcji testosteronu na poprawę zachowania Twojego psa.
- Niewielki implant wielkości ziarenka ryżu jest biokompatybilny, co oznacza brak konieczności jego usunięcia po zakończonym okresie jego działania.

Poproś lekarza weterynarii o więcej szczegółów.

© 04/2017 Virbac. All rights reserved.